

PLAN WYNIKOWY

(zakres podstawowy)

klasa 1.

Wstęp

Plan wynikowy kształcenia matematycznego jest dostosowany do programu nauczania matematyki w liceach i technicach – zakres podstawowy, autorstwa Marcina Kurczaba, Elżbiety Kurczab i Elżbiety Świdy, zamieszczonego na stronie internetowej www.pazdro.com.pl wiosną 2012 roku. Jest on przeznaczony dla nauczycieli oraz uczniów pracujących z podręcznikiem „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy” – numer ewidencyjny w wykazie podręczników: 412/1/2012 oraz zbiorami zadań do matematyki, autorstwa Elżbiety Kurczab, Marcina Kurczaba i Elżbiety Świdy, wydanymi przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro.

Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji w liceum lub w technikum.

Wymagania stawiane przed uczniem podzieliliśmy na trzy grupy:

- Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne);
- Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające);
- Wymagania wykraczające.

Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe.

Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące 40–60% wymagań podstawowych, zaś ocenę dostateczną uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 60 % wymagań podstawowych.

Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące do 75% wymagań dopełniających, zaś ocenę bardzo dobrą uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 75% wymagań dopełniających.

Ocenę celującą powinien uzyskać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności zawarte w wymaganiach wykraczających.

1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe

Tematyka zajęć:

- Zdanie. Zaprzeczenie zdania
- Koniunkcja zdań. Alternatywa zdań
- Implikacja. Równoważność zdań. Definicja. Twierdzenie
- Prawa logiczne. Prawa De Morgana
- Zbiór. Działania na zbiorach
- Zbiory liczbowe. Oś liczbowa
- Rozwiązywanie prostych równań
- Przedziały
- Rozwiązywanie prostych nierówności
- Zdanie z kwantyfikatorem

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi odróżnić zdanie logiczne od innej wypowiedzi; – umie określić wartość logiczną zdania prostego; – potrafi zanegować zdanie proste i określić wartość logiczną zdania zanegowanego; – potrafi rozpoznać zdania w postaci koniunkcji, alternatywy, implikacji i równoważności zdań; – potrafi zbudować zdania złożone w postaci koniunkcji, alternatywy, implikacji i równoważności zdań z danych zdań prostych; – potrafi określić wartości logiczne zdań złożonych, takich jak koniunkcja, alternatywa, implikacja i równoważność zdań; – potrafi odróżnić definicję od twierdzenia; – zna prawa De Morgana (prawo negacji 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi budować zdania złożone i oceniać ich wartości logiczne; – potrafi wnioskować o wartościach zdań składowych wybranych zdań złożonych na podstawie informacji o wartościach logicznych zdań złożonych; – rozumie budowę twierdzenia matematycznego; potrafi wskazać jego założenie i tezę; – potrafi zbudować twierdzenie odwrotne do danego oraz ocenić prawdziwość twierdzenia prostego i odwrotnego; – potrafi sprawnie posługiwać się symboliką matematyczną dotyczącą zbiorów; – potrafi podać przykłady zbiorów A i B, jeśli dana jest suma $A \cup B$, iloczyn $A \cap B$ albo różnica $A - B$; 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi negować zdania złożone z koniunkcji i/lub alternatyw zdań; – potrafi stosować wiadomości z logiki do wnioskowania matematycznego; – potrafi stosować działania na zbiorach do wnioskowania na temat własności tych zbiorów; – potrafi określić dziedzinę i zbiór elementów spełniających równanie z jedną niewiadomą, zawierające wyrażenia wymierne lub pierwiastek stopnia drugiego; – zna prawa De Morgana dla zdań z kwantyfikatorem; – potrafi podać negację zdania z kwantyfikatorem i ocenić jej wartość logiczną.

<p>alternatywy oraz prawo negacji koniunkcji) i potrafi je stosować;</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi określić wartość logiczną zdania, które jest negacją koniunkcji, oraz zdania, które jest negacją alternatywy zdań prostych; – zna takie pojęcia, jak: zbiór pusty, zbiory równe, podzbiór zbioru; – zna symbolikę matematyczną dotyczącą zbiorów ($\in, \notin, \cup, \cap, -, \subset, \varnothing$); – potrafi podać przykłady zbiorów (w tym przykłady zbiorów skończonych oraz nieskończonych); – potrafi określić relację pomiędzy elementem i zbiorem; – potrafi określać relacje pomiędzy zbiorami (równość zbiorów, zawieranie się zbiorów, rozłączność zbiorów); – zna definicję sumy, iloczynu, różnicy zbiorów; – potrafi wyznaczać sumę, iloczyn i różnicę zbiorów skończonych; – potrafi wyznaczyć sumę, różnicę oraz część wspólną podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych: N, C, NW, W; – potrafi rozróżnić liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne; – potrafi przedstawić liczbę wymierną w postaci ułamka zwykłego i w postaci rozwinięcia dziesiętnego; – umie zamienić ułamek o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym na ułamek zwykły; – potrafi zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej; – rozumie pojęcie przedziału, rozpoznaje 	<ul style="list-style-type: none"> – zna pojęcie dopełnienia zbioru i potrafi zastosować je w działaniach na zbiorach; – potrafi wyznaczyć dopełnienie przedziału lub dopełnienie zbioru liczbowego skończonego w przestrzeni R; – potrafi przeprowadzić proste dowody, w tym dowody „nie wprost”, dotyczące własności liczb rzeczywistych; – potrafi oceniać wartości logiczne zdań, w których występują zależności pomiędzy podzbiórami zbioru R; – potrafi wyznaczyć dziedzinę równania z jedną niewiadomą, w przypadku, gdy trzeba rozwiązać koniunkcję warunków; – potrafi podać przykład równania sprzecznego oraz równania tożsamościowego; – potrafi wskazać przykład nierówności sprecznej oraz nierówności tożsamościowej; – rozumie zwrot „dla każdego x” oraz „istnieje takie x, że” i potrafi stosować te zwroty w budowaniu zdań logicznych; – potrafi ocenić wartość logiczną zdania z kwantyfikatorem. 	
---	---	--

<p>przedziały ograniczone i nieograniczone;</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi zapisać za pomocą przedziałów zbiory opisane nierównościami; – potrafi zaznaczyć na osi liczbowej podany przedział liczbowy; – potrafi wyznaczyć sumę, różnicę oraz część wspólną przedziałów; – wie, co to jest równanie (nierówność) z jedną niewiadomą; – potrafi określić dziedzinę równania; – zna definicję rozwiązania równania (nierówności) z jedną niewiadomą; – wie, jakie równanie nazywamy równaniem sprzecznym, a jakie równaniem tożsamościowym; – wie, jaką nierówność nazywamy sprzeczną, a jaką nierównością tożsamościową. 		
--	--	--

Przykładowe zadania

<p><u>Zadanie 1.</u> Wśród poniższych wypowiedzi znajdują się zdania logiczne. Wskaż je. Oceń wartości logiczne zdań.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wyjdź do ogrodu! 2) Czy dzisiaj jest klasówka z matematyki? 3) Liczba 3 jest większa od liczby 8. 4) Liczba a jest liczbą parzystą. 5) Warszawa jest stolicą Polski. <p><u>Zadanie 2.</u> Dane jest zdanie: „2 jest liczbą parzystą i liczba 5 nie jest podzielna przez 3”.</p> <p>a) Oceń wartość logiczną zdania.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Wiadomo, że poniższe zdania złożone są fałszywe. Co można powiedzieć o zdaniach prostych tworzących dane zdania?</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ania poszła do Kasi lub Ania poszła do Oli. b) Jeśli Bartek będzie grał w gry komputerowe, to nie pójdzie do kina. <p><u>Zadanie 2.</u> Oceń wartość logiczną danego twierdzenia. Następnie sformułuj twierdzenie odwrotne do danego i określ, czy jest ono fałszywe, czy prawdziwe.</p> <p>a) Jeśli liczba całkowita jest podzielna przez 3</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Napisz negację zdania:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pojadę na wieś lub zostaną w domu i posprzątam swój pokój. b) Nie wyjdę z domu i obejrzę film lub poczytam książkę. <p><u>Zadanie 2.</u> Co można powiedzieć o zbiorach A i B, jeśli:</p> <p>a) $A \cap B = B$; b) $A \cup B \subset A$; c) $A - B = A \cap B$?</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Podaj przykład równania z jedną niewiadomą, którego dziedziną jest zbiór:</p>
---	--	---

<p>b) Napisz zaprzeczenie zdania; podaj prawo logiczne, z którego skorzystałeś.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Oceń wartość logiczną zdań: a) $-3^2 = 9$ b) $1^3 - 2^3 \neq (-1)^3$ c) $3 \cdot (1 - 8) \leq -3 \cdot (8 - 1)$</p> <p><u>Zadanie 4.</u> a) Wyznacz zbiory: $A \cup B$, $C \cap D$, $A - C$, jeśli: $A = \{-3, -2, -1, 3, 4\}$, $B = \{-2, 0, 1, 3\}$, $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. b) Wykonaj działania na zbiorach: $C - N$, $W \cup NW$, $W \cap R$. c) Wykonaj działania na przedziałach: $(2, 5) \cup (3, 8)$; $(-\infty, 3) - (0, 9)$; $(-7, 8) \cap (-7, +\infty)$.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> Przedstaw liczbę 2,3(04) w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Czy dana liczba jest wymierna czy niewymierna?</p> <p><u>Zadanie 6.</u> Dane jest równanie z niewiadomą x: $x - \sqrt{3} = 3$. a) Podaj dziedzinę tego równania. b) Jaka liczba spełnia to równanie?</p>	<p>i przez 7, to liczba ta jest podzielna przez 21. b) Jeśli liczba naturalna jest podzielna przez 3 i przez 6, to liczba ta jest podzielna przez 18.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Zbiór $A \cup B$ ma 7 elementów, zbiór B ma 4 elementy, zaś zbiór A ma 5 elementów. Ile elementów ma zbiór $A \cap B$?</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Wiedząc, że π jest liczbą niewymierną, wykaż, że liczba $2\pi - 1$ też jest liczbą niewymierną.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> a) Wyznacz zbiory: $(-3, 2) \cap N$; $C - (5, +\infty)$; $C_+ \cup (4, +\infty)$; $(2, 5) - N$. b) Znajdź dopełnienie danego zbioru w przestrzeni R: $A = (-7, +\infty)$; $B = \{-4, 3, 5\}$, $C = (2, 8) \cup \{0\}$.</p> <p><u>Zadanie 6.</u> Podaj przykład równania: a) którego zbiór rozwiązań jest jednoelementowy; b) którego zbiór rozwiązań jest dwuelementowy; c) które jest sprzeczne; d) które jest tożsamościowe.</p> <p><u>Zadanie 7.</u> Dana jest równanie z niewiadomą x: $(x - 3)(x + 2) = 0$. a) Określ dziedzinę równania. b) Podaj zbiór rozwiązań równania.</p>	<p>a) $R - \{-3, 0\}$ i które ma tylko dwa rozwiązania: 2, 3; b) $(2, +\infty)$ i które ma tylko jedno rozwiązanie 2.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Określ wartość logiczną zdania i podaj jego zaprzeczenie: a) $\bigwedge_{x \in N} (x + 2 > 0 \wedge x < 1000)$; b) $\bigvee_{x \in C_+} \left(\frac{x}{2} > 1 \vee x \leq 0 \right)$.</p>
--	---	--

	<p><u>Zadanie 7.</u> Oceń wartość logiczną zdania: „Dla dowolnej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność: $x^2 > 0$”.</p>	
--	---	--

2. Działania w zbiorach liczbowych

Tematyka zajęć:

- Zbiór liczb naturalnych i zbiór liczb całkowitych
- Zbiór liczb wymiernych i zbiór liczb niewymiernych
- Prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych
- Rozwiązywanie równań – metoda równań równoważnych
- Rozwiązywanie nierówności – metoda nierówności równoważnych
- Procenty
- Punkty procentowe
- Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną
- Przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny, szacowanie

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi wskazać liczby pierwsze i liczby złożone; – zna i potrafi stosować cechy podzielności liczb naturalnych (przez 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10); – potrafi rozłożyć liczbę naturalną na czynniki pierwsze; – potrafi wyznaczyć największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność liczb naturalnych; – potrafi wykonać dzielenie z resztą w zbiorze liczb naturalnych; 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zna i stosuje w obliczeniach zależność dotyczącą liczb naturalnych różnych od zera: $NWD(a, b) \cdot NWW(a, b) = a \cdot b$; – potrafi podać zapis symboliczny wybranych liczb, np. liczby parzystej, liczby nieparzystej, liczby podzielnej przez daną liczbę całkowitą, wielokrotności danej liczby; zapis liczby, która w wyniku dzielenia przez daną liczbę naturalną daje wskazaną resztę; – potrafi zapisać symbolicznie zbiór na 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozwiązywać zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące własności liczb rzeczywistych; – potrafi wykonać dzielenie z resztą w zbiorze liczb całkowitych ujemnych; – potrafi rozwiązać równania z wartością bezwzględną typu: $y + z = 0$.

<ul style="list-style-type: none"> – zna definicję liczby całkowitej parzystej oraz nieparzystej; – potrafi sprawnie wykonywać działania na ułamkach zwykłych i na ułamkach dziesiętnych; – zna i stosuje w obliczeniach kolejność działań i prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych; – potrafi porównywać liczby rzeczywiste; – zna własność proporcji i potrafi stosować ją do rozwiązywania równań zawierających proporcje; – zna twierdzenia pozwalające przekształcać w sposób równoważny równania i nierówności; – potrafi rozwiązywać równania z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych; – potrafi rozwiązywać nierówności z jedną niewiadomą metodą nierówności równoważnych; – potrafi obliczyć procent danej liczby, a także wyznaczyć liczbę, gdy dany jest jej procent; – potrafi obliczyć, jakim procentem danej liczby jest druga dana liczba; – potrafi określić, o ile procent dana wielkość jest większa (mniejsza) od innej wielkości; – potrafi posługiwać się procentem w prostych zadaniach tekstowych (w tym wzrosty i spadki cen, podatki, kredyty i lokaty); – rozumie pojęcie punktu procentowego i potrafi się nim posługiwać; – potrafi odczytywać dane w postaci tabel i diagramów, a także przedstawiać dane w postaci diagramów procentowych; – potrafi odczytywać dane przedstawione w tabeli lub na diagramie i przeprowadzać analizę procentową przedstawionych danych; – zna definicję wartości bezwzględnej liczby 	<p>podstawie informacji o jego elementach;</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi wymienić elementy zbioru zapisanego symbolicznie; – potrafi wykazać podzielność liczb całkowitych, zapisanych symbolicznie; – umie podać część całkowitą każdej liczby rzeczywistej i część ułamkową liczby wymiernej; – wie, kiedy dwa równania (dwie nierówności) są równoważne i potrafi wskazać równania (nierówności) równoważne; – potrafi rozwiązać proste równania wymierne typu $\frac{2}{x+7} = \frac{1}{4}$; $\frac{x-5}{x-2} = 0$ – rozumie zmiany bankowych stóp procentowych i umie wyrażać je w punktach procentowych (oraz bazowych); – potrafi zaznaczyć na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności z wartością bezwzględną typu: $x - a = b$, $x - a < b$, $x - a > b$, $x - a \leq b$, $x - a \geq b$ – potrafi na podstawie zbioru rozwiązań nierówności z wartością bezwzględną zapisać tę nierówność; – potrafi oszacować wartość liczby niewymiernej. 	
--	--	--

<p>rzeczywistej i jej interpretację geometryczną;</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi obliczyć wartość bezwzględną liczby; – umie zapisać i obliczyć odległość na osi liczbowej między dwoma dowolnymi punktami; – potrafi wyznaczyć przybliżenie dziesiętne liczby rzeczywistej z żadaną dokładnością; – potrafi obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny danego przybliżenia; – potrafi obliczyć błąd procentowy przybliżenia; – potrafi szacować wartości wyrażeń. 		
---	--	--

Przykładowe zadania


<p><u>Zadanie 1.</u> Bartek i Jurek postanowili zmierzyć odległość namiotu od przystani za pomocą swoich kroków. Bartek stawia kroki o długości 48 cm, natomiast Jurek o długości 56 cm. W jakiej odległości od namiotu znajduje się przystań, jeśli ślady stóp chłopców pokryły się 15 razy? Wynik wyraż w metrach.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Znajdź liczbę wymierną, która znajduje się na osi liczbowej między liczbami: a) $\frac{1}{8}$ i $\frac{1}{6}$; b) $\frac{5}{7}$ i $\frac{6}{7}$; c) $\sqrt{2}$ i $\sqrt{3}$.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> a) Rozwiąż nierówność: $\frac{x-2}{3} - \frac{x+5}{2} > 5-x$ b) Podaj najmniejszą liczbę pierwszą spełniającą tę nierówność.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Wyznacz zbiory $(A \cap B) - D$, $A \cup B$, $(A - B) - D$, jeśli: $A = \{x: x \in \mathbf{C} \mid x \in \langle -3, 4 \rangle\}$, $B = (-1, 2)$, $D = \{x: x \in \mathbf{R} \mid x-2 = 4\}$</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Wykaż, że suma trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielna przez 3.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Korzystając z interpretacji geometrycznej wartości bezwzględnej, rozwiąż równanie: $x + 3,5 = 5$. a) Podaj najmniejszą liczbę pierwszą, która jest większa od rozwiązań tego równania. b) Wyznacz odwrotność liczby $\frac{ a-b }{4}$, gdzie a, b są rozwiązaniami danego równania.</p> <p><u>Zadanie 4.</u></p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Iloczyn dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 1728, a największy ich wspólny dzielnik równa się 24. Znajdź te liczby.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Wyznacz wszystkie pary liczb całkowitych, spełniających równanie: $x - y = xy$.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Wykaż, że reszta z dzielenia przez 3 sumy kwadratów trzech dowolnych kolejnych liczb naturalnych wynosi 2.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Rozwiąż: a) równanie $x + 1 + x^2 - 1 = 0$ b) nierówność $2 - x + x \cdot (x - 2) \leq 0$.</p>
--	---	---

Zadanie 4.

Jabłka zdrożały o 20% i wówczas cena jednego kilograma jabłek wynosiła 4,80 zł. O ile procent cena jabłek przed podwyżką była niższa niż po podwyżce?

Zadanie 5.

Uczestnicy obozu językowego posługiwali się trzema językami obcymi: angielskim (A), hiszpańskim (H) i niemieckim (N), zgodnie z następującym podziałem procentowym:



- Jaki procent wszystkich uczestników obozu znało język angielski?
- Jaki procent osób znających język niemiecki znało również pozostałe dwa języki?
- O ile punktów procentowych więcej było na obozie osób ze znajomością tylko języka angielskiego od osób, które znały tylko język hiszpański?
- O ile procent mniej było na obozie uczniów, którzy znali tylko język hiszpański od uczniów, którzy znali język angielski lub niemiecki?

Zadanie 6.

- Porównaj liczby:

a) Oblicz: $|2 - 3\sqrt{3}|$.

b) Rozwiąż nierówność: $|x + 3| \geq 4$.

c) Przedział liczbowy $(-5, 7)$ jest zbiorem rozwiązań pewnej nierówności z wartością bezwzględną. Zapisz tę nierówność.

Zadanie 5.

Sprawdź (nie używając kalkulatora), czy liczba

$\frac{2\sqrt{5}-1}{5}$ należy do przedziału $\left(\frac{3}{5}, 1\right)$.

<p> $a = \left \frac{\sqrt{5}}{5} - 1 \right$ oraz $b = -1,5$; b) Oblicz odległość między liczbami -6 i 12; c) Rozwiąż równanie $x = 3$ i nierówność $x < 5$. </p> <p><u>Zadanie 7.</u></p> <p>Na zawodach w skokach narciarskich komentator sportowy ocenił pierwszy skok zawodnika na 122 m, podczas gdy skoczek osiągnął długość skoku równą $124,5$ m. Drugi skok miał długość $123,5$ m, zaś komentator ocenił go na 126 m. W którym przypadku komentator popełnił większy błąd?</p>		
--	--	--

3. Wyrażenia algebraiczne

Tematyka zajęć:

- Potęga o wykładniku naturalnym
- Pierwiastek arytmetyczny. Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby ujemnej
- Działania na wyrażeniach algebraicznych
- Wzory skróconego mnożenia
- Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym
- Potęga o wykładniku wymiernym
- Potęga o wykładniku rzeczywistym
- Dowodzenie twierdzeń
- Określenie logarytmu
- Zastosowanie logarytmów
- Przekształcanie wzorów
- Średnie

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi wykonywać działania na potęgach o wykładniku naturalnym, całkowitym i wymiernym; – zna prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych i stosuje je w obliczeniach; – potrafi zapisać liczbę w notacji wykładniczej; – sprawnie sprowadza wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci i oblicza ich wartości dla podanych wartości zmiennych; – potrafi wyłączać wspólny czynnik z różnych wyrażeń; – potrafi sprawnie posługiwać się wzorami skróconego mnożenia: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ – i sprawnie wykonuje działania na wyrażeniach, które zawierają wymienione wzory skróconego mnożenia; – potrafi usuwać niewymierność z mianownika ułamka, stosując wzór skróconego mnożenia (różnicę kwadratów dwóch wyrażeń); – zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego z liczby nieujemnej i potrafi stosować prawa działań na pierwiastkach w obliczeniach; – potrafi obliczać pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych; – potrafi dowodzić proste twierdzenia; – zna definicję logarytmu i potrafi obliczać logarytmy bezpośrednio z definicji; – sprawnie przekształca wzory matematyczne, 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawnie przekształca wyrażenia algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki; – sprawnie zamienia pierwiastki arytmetyczne na potęgi o wykładniku wymiernym i odwrotnie; – sprawnie wykonywać działania na potęgach o wykładniku rzeczywistym; – potrafi wyłączać wspólną potęgę poza nawias; – potrafi rozłożyć wyrażenia na czynniki metodą grupowania wyrazów lub za pomocą wzorów skróconego mnożenia; – potrafi oszacować wartość potęgi o wykładniku rzeczywistym; – potrafi dowodzić twierdzenia, posługując się dowodem wprost; – potrafi dowodzić twierdzenia, posługując się dowodem nie wprost; – zna i potrafi stosować własności logarytmów w obliczeniach; – stosuje średnią arytmetyczną, średnią ważoną i średnią geometryczną w zadaniach tekstowych. 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi sprawnie działać na wyrażeniach zawierających potęgi i pierwiastki z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia; – potrafi sprawnie rozkładać wyrażenia zawierające potęgi i pierwiastki na czynniki, stosując jednocześnie wzory skróconego mnożenia i metodę grupowania wyrazów; – potrafi wykorzystać pojęcie logarytmu (a także cechy i mantysy logarytmu dziesiętnego) w zadaniach praktycznych.

fizyczne i chemiczne; – zna pojęcie średniej arytmetycznej, średniej ważonej i średniej geometrycznej liczb oraz potrafi obliczyć te średnie dla podanych liczb.		
---	--	--


Przykładowe zadania

<p><u>Zadanie 1.</u> Oblicz wartość wyrażenia: $8^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2} + \left(\frac{1}{9^{\frac{1}{2}}}\right) \cdot \left(27^{-\frac{2}{3}}\right) + \sqrt[3]{-64}$</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Usuń niewymierność z mianownika ułamka: a) $\frac{3-\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}$ b) $\frac{\sqrt{8}-4}{2-\sqrt{2}}$</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) $(a-b) - (a-b)^2$ b) $(b-a)xy + (a-b)xyz - (b-a)z^2$</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Wykaż, że jeśli a i b są liczbami dodatnimi to $a + b \geq 2\sqrt{ab}$.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> Oblicz: $3\log(\log_2 32 \cdot \log_5 25)$.</p> <p><u>Zadanie 6.</u> Wyznacz podaną wielkość ze wzoru:</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Sprowadź wyrażenie: $[y^3 : (y^2 \cdot y^{-3})]^4 : \left[\left(\frac{1}{y}\right)^4 \cdot \frac{1}{y^{-2}}\right]^{-3}$ do najprostszej postaci i oblicz jego wartość dla $y = \sqrt{2\sqrt{2}}$.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Wykaż, że liczba $6^{20} + 3 \cdot 6^{19} - 4 \cdot 6^{18}$ jest podzielna przez 5.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Oblicz (bez użycia kalkulatora) przybliżoną wartość potęgi: $0,0001^{-\sqrt{5}}$, jeśli $\sqrt{5} \approx 2,25$.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Wykaż, że jeśli $a + b = 1$ i $a^2 + b^2 = 5$, to $a^4 + b^4 = 17$.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> Wykaż, stosując dowód nie wprost, że jeśli liczby a i b są dodatnie, to $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$.</p> <p><u>Zadanie 6.</u> Niech $\log 2 = a$ i $\log 3 = b$. Wyraź za pomocą a i b wyrażenie: $\log 8 \cdot \log_8 6$.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Oblicz wartość wyrażenia: $\left[\left(4 - 12^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(4 + 12^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2$</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Wykaż, że liczba $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt[4]{4}$ jest całkowita.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Rozłóż na czynniki wyrażenia: a) $x^4 + 1$ b) $x^6 - 2x^4 - 2x^2 + 4$</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Oblicz wartość pH kwasu solnego, wiedząc, że stężenie jonów wodorowych w tym kwasie jest równe $0,05 \text{ mol/dm}^3$. Wynik podaj w przybliżeniu dziesiętnym, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.</p>
--	---	---

a) $\frac{1}{f} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$; f b) $P = 2\pi r(r + h)$; h

Zadanie 7.

Poniższy diagram przedstawia wynagrodzenie brutto pracowników pewnej firmy w tym miesiącu.



- a) Oblicz średnie wynagrodzenie brutto w tej firmie.
b) Podaj, jaki procent pracowników zarabia więcej, niż wynosi średnie wynagrodzenie w tej firmie.
c) Od przyszłego miesiąca każdy pracownik ma zarabiać o 100 zł więcej, niż w tym miesiącu. Oblicz średni procent, o jaki planowany jest wzrost wynagrodzeń w tej firmie. Wyniki podaj w przybliżeniu dziesiętnym, z dokładnością do 0,1%.

Zadanie 7.

Na wycieczkę w góry pojechało 21 osób o średniej wieku 23 lata. Średnia ta wzrosła do 24 lat, po doliczeniu wieku przewodnika, który dołączył do wycieczki w Zakopanem. Ile lat miał przewodnik?

4. Geometria płaska – pojęcia wstępne

Tematyka zajęć:


- Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona
- Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta
- Dwie proste przecięte trzecią prostą
- Twierdzenie Talesa
- Okrąg i koło
- Kąty i koła

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zna figury podstawowe (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń) i potrafi zapisać relacje między nimi; – zna pojęcie figury wypukłej i wklęsłej; potrafi podać przykłady takich figur; – zna pojęcie figury ograniczonej i figury nieograniczonej, potrafi podać przykłady takich figur; – umie określić położenie prostych na płaszczyźnie; – rozumie pojęcie odległości, umie wyznaczyć odległość dwóch punktów, punktu od prostej, dwóch prostych równoległych; – zna określenie kąta i podział kątów ze względu na ich miarę; – zna pojęcie kątów przyległych i kątów wierzchołkowych oraz potrafi zastosować własności tych kątów w rozwiązywaniu prostych zadań; – zna pojęcie dwusiecznej kąta i symetralnej 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi zapisać miarę stopniową kąta, używając minut i sekund; – potrafi udowodnić twierdzenie dotyczące sumy miar kątów w trójkącie (czworokącie); – potrafi skonstruować styczną do okręgu, przechodzącą przez punkt leżący w odległości większej od środka okręgu niż długość promienia okręgu; potrafi skonstruować styczną do okręgu przechodzącą przez punkt leżący na okręgu; – wie, co to jest kąt dopisany do okręgu; zna twierdzenie o kątach wpisanych i dopisanych do okręgu, opartych na tym samym łuku; – potrafi rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności dotyczące okręgów, stycznych, kątów środkowych, wpisanych i dopisanych, z zastosowaniem poznanych twierdzeń; – potrafi rozwiązywać zadania złożone, wymagające wykorzystania równocześnie kilku poznanych własności. 	<p>– Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozwiązywać nietypowe zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące odcinków, prostych, półprostych, kątów i kół, w tym z zastosowaniem poznanych twierdzeń; – zna i potrafi udowodnić twierdzenie o dwusiecznych kątów przyległych; – umie udowodnić twierdzenia o kątach środkowych i wpisanych w koło; – umie udowodnić twierdzenie o kącie dopisanym do okręgu; – umie udowodnić własności figur geometrycznych w oparciu o poznane twierdzenia.

<p>odcinka, potrafi zastosować własność dwusiecznej kąta oraz symetralnej odcinka w rozwiązywaniu prostych zadań,</p> <ul style="list-style-type: none"> – umie skonstruować dwusieczną danego kąta i symetralną danego odcinka; – zna własności kątów utworzonych między dwiema prostymi równoległymi, przeciętymi trzecią prostą i umie zastosować je w rozwiązywaniu prostych zadań; potrafi uzasadnić równoległość dwóch prostych, znajdując równe kąty odpowiadające; – zna twierdzenie Talesa; potrafi je stosować do podziału odcinka w danym stosunku, do konstrukcji odcinka o danej długości, do obliczania długości odcinka w prostych zadaniach; – zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa i potrafi je stosować do uzasadnienia równoległości odpowiednich odcinków lub prostych; – zna wnioski z twierdzenia Talesa i potrafi je stosować w rozwiązywaniu prostych zadań; – zna definicję koła i okręgu, poprawnie posługuje się terminami: promień, środek okręgu, cięciwa, średnica, łuk okręgu; – potrafi określić wzajemne położenie prostej i okręgu; – zna definicję stycznej do okręgu; – zna twierdzenie o stycznej do okręgu i potrafi je wykorzystywać przy rozwiązywaniu prostych zadań; – zna twierdzenie o odcinkach stycznych i potrafi je stosować w rozwiązywaniu prostych zadań; – umie określić wzajemne położenie dwóch 		
--	--	--

okręgów; – posługuje się terminami: kąt wpisany w koło, kąt środkowy koła; zna twierdzenia dotyczące kątów wpisanych i środkowych i umie je zastosować przy rozwiązywaniu prostych zadań.		
--	--	--

Przykładowe zadania

<p><u>Zadanie 1.</u> Punkt C dzieli odcinek AB długości 24 cm na dwa odcinki, których stosunek długości jest równy $6 : 2$. Jaka jest długość każdego z odcinków?</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 21°. Oblicz miary tych kątów.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Na płaszczyźnie dane są punkty: A, B, P, Q, przy czym $A \neq B$, $AP = \sqrt{12}$ cm, $BP = 3\sqrt{2}$ cm, $AQ = \frac{49}{9}$ cm, $BQ = 5,4$ cm. Sprawdź, czy punkty P, Q należą do symetralnej odcinka AB. Z jakiej własności symetralnej skorzystasz?</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Dany jest odcinek długości a. Podziel ten odcinek: a) na 5 odcinków równej długości; b) w stosunku $2 : 7$.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> W trapezie $ABCD$, $AB \parallel CD$, mamy dane: $AB = 12$ cm, $CD = 7$ cm, $AD = 8$ cm. O ile</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Długości odcinków AB, AC, BC, BD i CD spełniają warunki: $AB = AC + BC$ oraz $BC + BD = CD$. Wykaż, że punkty A, B, C, D leżą na jednej prostej.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Kąty AOC i BOD są kątami wierzchołkowymi. Wykaż, że przedłużenie dwusiecznej kąta AOC jest dwusieczną kąta BOD.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> W trójkącie ABC poprowadzono trzy proste równoległe do podstawy AB, dzielące bok BC na cztery odcinki równej długości. Suma długości odcinków tych prostych zawartych w trójkącie ABC jest o 6 dm większa od długości podstawy AB. Oblicz AB.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Prosta k jest styczna do okręgu. Oblicz miarę kąta α dopisanego do okręgu:</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Cięciwy AB i CD przecinają się pod kątem 36°. Wyznacz kąty środkowe, odpowiadające łukom AC i BD, jeżeli stosunek ich długości wynosi $1 : 3$.</p>  <p><u>Zadanie 2.</u> Do danego okręgu poprowadzono styczną tak, że końce A i B średnicy AB tego okręgu są odległe od stycznej o 25 cm i 15 cm. Oblicz długość średnicy AB.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Wykaż, że prawdziwe jest twierdzenie: Jeśli istnieje okrąg, który jest styczny do wszystkich boków czworokąta wypukłego, to sumy długości dwóch przeciwległych boków tego czworokąta są sobie równe.</p> <p><u>Zadanie 4.</u></p>
--	---	--



należy wydłużyć ramię AD , aby przecięło się z przedłużeniem ramienia BC ?

Zadanie 6.

Miara kąta utworzonego przez dwa promienie okręgu wynosi 146° . Oblicz miarę kąta, który tworzą styczne poprowadzone przez końce tych promieni.

Zadanie 7.

Wyznacz miary kątów trójkąta ABC .



Zadanie 5.

Dane są dwa okręgi $o(A, r_1)$, $o(B, r_2)$ takie, że $r_1 = 3k + 1$, $r_2 = 2k + 3$, $|AB| = 6k - 3$. Określ położenie okręgów, w zależności od parametru k .


Zadanie 6.

Z punktu zewnętrznego A poprowadzono styczne AB i AC do okręgu o środku w punkcie O (B, C – punkty styczności). Wykaż, że jeśli miara kąta między stycznymi równa się mierze kąta zawartego między promieniami poprowadzonymi ze środka koła do punktów styczności, to czworokąt $ABOC$ jest kwadratem.

Wykaż, że jeśli przez wszystkie wierzchołki czworokąta wypukłego można poprowadzić okrąg, to sumy miar przeciwległych kątów czworokąta są równe 180° .

Zadanie 5.

Punkt D leży na łuku BC wewnątrz trójkąta ABC . Wykaż, że suma $|\angle ABD| + |\angle ACD|$ jest stała (tzn. nie zależy od położenia punktu D na łuku BC). Czy teza zadania będzie prawdziwa, jeśli punkt D będzie leżał na łuku BC na zewnątrz trójkąta ABC ?



5. Geometria płaska – trójkąty

Tematyka zajęć:

- Podział trójkątów. Suma kątów w trójkącie. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie
- Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
- Wysokości w trójkącie. Środkowe w trójkącie
- Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie
- Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt
- Przystawanie trójkątów
- Podobieństwo trójkątów

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zna podział trójkątów ze względu na boki i kąty; – wie, ile wynosi suma miar kątów w trójkącie i w czworokącie; – zna warunek na długość odcinków, z których można zbudować trójkąt; – zna twierdzenie dotyczące odcinka łączącego środki dwóch boków trójkąta i potrafi je zastosować w rozwiązywaniu prostych zadań; – zna twierdzenie Pitagorasa i umie je zastosować w rozwiązywaniu prostych zadań; – zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa i wykorzystuje je do sprawdzenia, czy dany trójkąt jest prostokątny; – umie określić na podstawie długości boków trójkąta, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny; – umie narysować wysokości w trójkącie i wie, że wysokości (lub ich przedłużenia) przecinają się w jednym punkcie; – zna twierdzenie o środkowych w trójkącie oraz potrafi je zastosować przy rozwiązywaniu prostych zadań; – zna pojęcie środka ciężkości trójkąta; – zna twierdzenie o symetralnych boków w trójkącie; – wie, że punkt przecięcia symetralnych boków trójkąta jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie i potrafi skonstruować ten okrąg; – zna twierdzenie o dwusiecznych kątów w trójkącie; – wie, że punkt przecięcia się dwusiecznych 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zna zależności między bokami w trójkącie (nierówności trójkąta) i stosuje je przy rozwiązywaniu zadań; – potrafi udowodnić twierdzenie o odcinku łączącym środki boków w trójkącie; – zna i umie zastosować w zadaniach własność wysokości w trójkącie prostokątnym, poprowadzonej na przeciwprostokątną; – potrafi obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny i długość promienia okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym, mając dane długości boków trójkąta; – potrafi udowodnić proste własności trójkątów, wykorzystując cechy przystawiania trójkątów; – potrafi uzasadnić, że symetralna odcinka jest zbiorem punktów płaszczyzny równoodległych od końców odcinka; – potrafi uzasadnić, że każdy punkt należący do dwusiecznej kąta leży w równej odległości od ramion tego kąta; – potrafi udowodnić twierdzenie o symetralnych boków i twierdzenie o dwusiecznych kątów w trójkącie; – umie udowodnić twierdzenie o odcinkach stycznych; – potrafi rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności dotyczące okręgów wpisanych w trójkąt i okręgów opisanych na trójkącie; – potrafi stosować cechy podobieństwa trójkątów do rozwiązania zadań z wykorzystaniem innych, wcześniej poznanych własności; 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczących trójkątów, z wykorzystaniem poznanych twierdzeń; – potrafi udowodnić twierdzenie o środkowych w trójkącie; – potrafi udowodnić twierdzenie dotyczące wysokości w trójkącie prostokątnym, poprowadzonej na przeciwprostokątną.

<p>kątów w trójkącie jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt i potrafi skonstruować ten okrąg;</p> <p>– zna i stosuje przy rozwiązywaniu prostych zadań własności trójkąta równobocznego: długość wysokości w zależności od długości boku, długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie, długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt;</p> <p>– zna i stosuje własności trójkąta prostokątnego: suma miar kątów ostrych trójkąta, długość wysokości w trójkącie prostokątnym równoramiennym w zależności od długości przyprostokątnej; długość promienia okręgu opisanego na trójkącie i długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt w zależności od długości boków trójkąta, zależność między długością środkowej poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego a długością przeciwprostokątnej;</p> <p>– zna podstawowe własności trójkąta równoramiennego i stosuje je przy rozwiązywaniu prostych zadań;</p> <p>– zna trzy cechy przystawiania trójkątów i potrafi je zastosować przy rozwiązywaniu prostych zadań;</p> <p>– zna cechy podobieństwa trójkątów; potrafi je stosować do rozpoznawania trójkątów podobnych i przy rozwiązaniach prostych zadań;</p> <p>– umie obliczyć skalę podobieństwa trójkątów podobnych.</p>	<p>– potrafi rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności dotyczące trójkątów, z zastosowaniem poznanych do tej pory twierdzeń.</p>	
--	--	--

Przykładowe zadania

Zadanie 1.

W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie jest dwa razy większy niż kąt przy wierzchołku. Wyznacz kąty tego trójkąta.

Zadanie 2.

Wielkość telewizora wyraża się długością przekątnej ekranu mierzonej w calach (1 cal = 2,54 cm). Oblicz, ile cali ma telewizor, którego wymiary ekranu wynoszą 42 cm na 31,5 cm. Wynik podaj z dokładnością do 1 cala.


Zadanie 3.

Dane są odcinki długości a , b oraz c . Skonstruuj

odcinek długości: $\frac{\sqrt{3ac}}{\sqrt{2b}}$.

Zadanie 4.

Czy poniższe trójkąty są przystające? Odpowiedź uzasadnij.



Zadanie 5.

W trójkącie ABC dane są długości boków: $|AB| = 12$ cm, $|BC| = 8$ cm, $|AC| = 10$ cm. Punkt D dzieli bok AB na takie dwa odcinki, że $|AD| : |DB| = 3 : 5$. Przez punkt D poprowadzono prostą równoległą do boku AC , która przecięła bok BC w punkcie E . Oblicz długości odcinków: CE , BE i DE .

Zadanie 1.

Dwa boki trójkąta mają długość 1 cm i 4 cm. Oblicz obwód tego trójkąta, jeżeli wiadomo, że długość trzeciego boku wyraża się liczbą naturalną.

Zadanie 2.

W trójkącie prostokątnym ABC przedłużono przeciwprostokątną AB i obrano na przedłużeniach punkty D i E tak, że $|AD| = |AC|$ oraz $|BE| = |BC|$. Oblicz miarę kąta DCE .

Zadanie 3.

W trójkącie boki mają długość: 17 cm, 25 cm, 28 cm.

- Sprawdź, czy ten trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny.
- Oblicz długość wysokości poprowadzonej na najdłuższy bok.
- Podaj długość odcinków, na jakie spodek wysokości podzielił najdłuższy bok trójkąta.

Zadanie 4.

Udowodnij, że w trójkącie równoramiennym dwusieczne kątów przy podstawie są równej długości.

Zadanie 5.

W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: $|AB| = 32$ cm, $|AC| = 24$ cm. Symetralna boku BC przecina ten bok w punkcie D , bok AB w punkcie E i przedłużenie boku AC w punkcie F . Udowodnij, że trójkąt EBD jest

Zadanie 1.

Wykaż, że suma odległości dowolnego punktu płaszczyzny od wierzchołków czworokąta jest większa od połowy obwodu tego czworokąta.

Zadanie 2.

W trójkącie równoramiennym wysokość opuszczona na podstawę jest równa odcinkowi, który łączy środek podstawy ze środkiem ramienia. Podstawa trójkąta ma długość a . Jaką długość ma wysokość opuszczona na podstawę?

Zadanie 3.


Niech a , b , c będą długościami boków w dowolnym trójkącie. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność: $a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$.

Zadanie 4.

Dany jest trójkąt ABC , w którym $|AB| = |AC|$ oraz $|\angle ABC| = 3|\angle BAC|$. Wykaż, że jeżeli półproste BK^{\rightarrow} i BL^{\rightarrow} dzielą kąt $\angle ABC$ na trzy równe części ($|\angle LBC| = \frac{1}{3}|\angle ABC|$), to trójkąty BCL , BCK , BKA są równoramienne.

Zadanie 5.

Okręgi o promieniach długości 2 cm i 3 cm są styczne zewnętrznie w punkcie A . Znajdź odległość punktu A od prostej, do której nie należy punkt A , a która jest styczna jednocześnie do obu okręgów.

<p><u>Zadanie 6.</u> W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość 4 cm. Spodek tej wysokości leży w odległości $1\frac{1}{6}$ cm od środka okręgu opisanego na trójkącie. Oblicz: a) długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie; b) długość boków tego trójkąta.</p> <p><u>Zadanie 7.</u> W trójkąt prostokątny równoramienny wpisano dwa okręgi, styczne zewnętrznie do siebie, każdy o promieniu 1 cm (jak na rysunku poniżej).</p>  <p>Oblicz obwód tego trójkąta.</p>	<p>podobny do trójkąta EAF i oblicz skalę tego podobieństwa.</p> <p><u>Zadanie 6.</u> Dany jest trójkąt równoboczny ABC. Punkty P, Q, R leżą na bokach trójkąta ABC (po jednym na każdym boku) w taki sposób, że każdy bok trójkąta PQR jest prostopadły do jednego boku trójkąta ABC. a) Wykaż, że trójkąt PQR jest równoboczny. b) Wyznacz stosunek $\frac{ AB }{ PQ }$.</p>	
---	--	--

6. Trygonometria kąta wypukłego

Tematyka zajęć:

- Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym
- Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dla kątów $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$
- Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta wypukłego
- Podstawowe tożsamości trygonometryczne
- Wybrane wzory redukcyjne
- Trygonometria – zadania różne

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym o danych długościach boków; – potrafi korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora); – zna wartości funkcji trygonometrycznych kątów o miarach 30°, 45°, 60°; – potrafi rozwiązywać trójkąty prostokątne; – potrafi obliczać wartości wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne kątów o miarach 30°, 45°, 60°; – zna definicje sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dowolnego kąta wypukłego; – potrafi wyznaczyć (korzystając z definicji) wartości funkcji trygonometrycznych takich kątów wypukłych, jak: 120°, 135°, 150°; – zna znaki funkcji trygonometrycznych kątów wypukłych, różnych od 90°; zna wartości funkcji trygonometrycznych (o ile istnieją) kątów o miarach: 0°, 90°, 180°; – potrafi obliczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego, gdy dana jest jedna z nich; – zna i potrafi stosować podstawowe tożsamości trygonometryczne (w odniesieniu do kąta wypukłego): $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1;$ – zna wzory redukcyjne dla kąta $90^\circ - \alpha$, $90^\circ + \alpha$ oraz $180^\circ - \alpha$; – potrafi stosować poznane wzory redukcyjne 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi dowodzić różne tożsamości trygonometryczne; – potrafi wykorzystać kilka zależności trygonometrycznych w rozwiązaniu zadania; – potrafi rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności, wykorzystując także wcześniej poznaną wiedzę o figurach geometrycznych. 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające niekonwencjonalnych pomysłów i metod.

<p>w obliczaniu wartości wyrażeń; – potrafi zastosować poznane wzory redukcyjne w zadaniach geometrycznych; – potrafi zbudować kąt wypukły znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych tego kąta.</p>		
--	--	--

Przykładowe zadania

<p><u>Zadanie 1.</u> Oblicz wartość wyrażenia: $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ \cdot \operatorname{ctg} 30^\circ$.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> W trójkącie prostokątnym ABC dane są: długość przeciwprostokątnej $BC = \sqrt{146}$ cm oraz długość przyprostokątnej $AB = 5$ cm. a) Oblicz długość drugiej przyprostokątnej. b) Oblicz miary kątów ostrych trójkąta (skorzystaj z tablic wartości funkcji trygonometrycznych). c) Oblicz długość wysokości trójkąta poprowadzonej na przeciwprostokątną oraz cosinus kąta, jaki tworzy ta wysokość z krótszą przyprostokątną.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Kąt wzniesienia wieży, zmierzony w odległości 80 m od jej podstawy, ma miarę 48°. Jaką wysokość ma wieża?</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Wyznacz, korzystając z definicji, wartości funkcji trygonometrycznych kąta 120°.</p> <p><u>Zadanie 5.</u></p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Zbuduj kąt o mierze α, $\alpha \in (0^\circ, 180^\circ)$ takiej, że a) $\sin \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ b) $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{7}$.</p> <p>Wyznacz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta α.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Posługując się wzorem $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$, oblicz $\sin 15^\circ$.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> W trójkącie prostokątnym a, b oznaczają długości przyprostokątnych, α jest miarą kąta leżącego naprzeciw przyprostokątnej długości a. Wiedząc, że $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{10}$, oblicz: a) tangens α b) wartość wyrażenia: $\frac{b}{a+b} + \frac{a^2}{a^2 - b^2}$.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Sprawdź, czy równość $\frac{\operatorname{co} \alpha + \operatorname{tg} \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ jest tożsamością trygonometryczną, wiedząc, że $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Wiedząc, że α jest kątem ostrym oraz $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, oblicz $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha$.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Balon wznosi się pionowo. W chwili, gdy znajduje się na wysokości h metrów nad ziemią, osoba lecąca balonem mierzy kąt depresji α przedmiotu znajdującego się na ziemi. Po upływie t sekund powtarza pomiar i otrzymuje kąt β. Z jaką średnią prędkością v wznosi się balon?</p>
--	--	--

<p>Oblicz, stosując odpowiednie wzory redukcyjne, wartość wyrażenia:</p> <p>a) $\sin 135^\circ + \operatorname{tg} 120^\circ \cdot \cos 150^\circ$ b) $\sin^2 17^\circ + \sin^2 73^\circ - \cos 120^\circ$.</p> <p><u>Zadanie 6.</u> Oblicz, bez użycia tablic i kalkulatora: $\operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 40^\circ \cdot \operatorname{tg} 130^\circ$.</p> <p><u>Zadanie 7.</u> Zbuduj kąt o mierze α, $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ takiej, że</p> <p>a) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ b) $\operatorname{ctg} \alpha = -4$.</p> <p>Wyznacz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta α.</p>	<p><u>Zadanie 5.</u> Niech α, β, γ oznaczają miary kątów dowolnego trójkąta. Wykaż, że prawdziwa jest zależność:</p> $\sin \frac{\alpha}{2} = \cos \frac{\beta + \gamma}{2}.$	
---	---	--

7. Geometria płaska – pole koła, pole trójkąta

Tematyka zajęć:

- Pole figury geometrycznej
- Pole trójkąta, cz. 1
- Pole trójkąta, cz. 2
- Pola trójkątów podobnych
- Pole koła, pole wycinka koła

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozumie pojęcie pola figury; zna wzór na pole kwadratu i pole prostokąta; – zna następujące wzory na pole trójkąta: 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi wyprowadzić wzór na pole trójkąta równobocznego i wzory: $P = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$; 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozwiązywać nietypowe zadania geometryczne o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem wzorów na pola figur i innych twierdzeń.

<p> $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, gdzie a – długość boku trójkąta równobocznego $P = \frac{1}{2} a \cdot h_a$ $P = a \cdot b \cdot \sin \gamma$, gdzie $\gamma \in (0^\circ, 180^\circ)$ $P = \frac{abc}{4R}$, $P = \frac{1}{2} p \cdot r$, gdzie $p = \frac{a+b+c}{2}$ $P = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, gdzie $p = \frac{a+b+c}{2}$; </p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, wykorzystując wzory na pole trójkąta i poznane wcześniej twierdzenia; – potrafi obliczyć wysokość trójkąta, korzystając ze wzoru na pole; – potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, wykorzystując wzory na ich pola i poznane wcześniej twierdzenia, w szczególności twierdzenie Pitagorasa oraz własności okręgu wpisanego w trójkąt i okręgu opisanego na trójkącie; – zna twierdzenie o polach figur podobnych; potrafi je stosować przy rozwiązywaniu prostych zadań; – zna wzór na pole koła i pole wycinka koła; umie zastosować te wzory przy rozwiązywaniu prostych zadań; wie, że pole wycinka koła jest wprost proporcjonalne do miary odpowiadającego mu kąta środkowego koła i jest wprost proporcjonalne do 	<p> $P = \frac{1}{2} p \cdot r$, gdzie $p = \frac{a+b+c}{2}$, ze wzoru $P = \frac{1}{2} ah_a$; </p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi rozwiązywać zadania geometryczne o średnim stopniu trudności, wykorzystując wzory na pola trójkątów, w tym również z wykorzystaniem poznanych wcześniej własności trójkątów; – potrafi rozwiązywać zadania geometryczne, wykorzystując cechy podobieństwa trójkątów, twierdzenie o polach figur podobnych i uwzględniając wcześniej poznane twierdzenia geometryczne. 	
--	--	--

długości odpowiadającego mu łuku okręgu oraz umie zastosować tę wiedzę przy rozwiązywaniu prostych zadań.		
---	--	--

Przykładowe zadania

<p><u>Zadanie 1.</u> Z kawałka trójkątnego materiału o obwodzie 1,12 m i polu 504 cm^2 wycięto koło, styczne do boków tego trójkąta. Oblicz długość promienia wyciętego koła.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Boki trójkąta mają długość 21 cm, 17 cm, 10 cm. Oblicz: a) pole trójkąta; b) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt; c) długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> W trójkącie dwa boki mają długość 12 cm i 10 cm, zaś kąt zawarty między tymi bokami ma miarę 150°. Oblicz pole tego trójkąta.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 6 cm i 8 cm. Korzystając ze wzoru na pole trójkąta, oblicz odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> Kąt wpisany w koło ma miarę 45° i jest oparty na</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest dwa razy krótsza od przeciwprostokątnej. Oblicz stosunek pola koła wpisanego w ten trójkąt do pola koła opisanego na tym trójkącie.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> W trójkącie rozwartokątnym, którego pole jest równe 27 cm^2, dwa boki mają długość 18 cm i 6 cm. Jaką miarę ma kąt zawarty między tymi bokami?</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Na trójkącie ABC, w którym $AC = BC$, opisano okrąg o środku O i promieniu $R = 20 \text{ cm}$. Wiedząc, że $\angle AOB = 120^\circ$, oblicz pole trójkąta oraz długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Rozważ dwa przypadki.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> W trójkącie równoramiennym podstawa ma 16 cm długości, a ramię ma 17 cm długości. Oblicz odległość środka wysokości poprowadzonej na podstawę trójkąta od ramienia trójkąta.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> Prosta równoległa do podstawy AB trójkąta ABC,</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> W trójkącie poprowadzono środkowe, które podzieliły dany trójkąt na sześć mniejszych trójkątów. Wykaż, że pola powstałych trójkątów są równe.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Wyznacz długość boku c trójkąta, jeśli dane są długości a, b dwóch jego boków oraz wiadomo, że $h_a + h_b = h_c$, gdzie h_a, h_b, h_c są długościami wysokości opuszczonych na odpowiednie boki tego trójkąta.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Wykaż, że okrąg wpisany w trójkąt prostokątny jest styczny do przeciwprostokątnej w punkcie dzielącym ją na dwa odcinki, których iloczyn długości jest równy polu tego trójkąta.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Wykaż, że pole trójkąta wyraża się wzorem: $P = \frac{abc}{4R}$, gdzie a, b, c oznaczają długości boków trójkąta, R to długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie, jeśli trójkąt jest: a) prostokątny b) ostrokątny.</p>
---	---	--

<p>łuku długości 3π cm. Oblicz pole wycinka koła wyznaczonego przez ten łuk.</p> <p><u>Zadanie 6.</u></p> <p>Trójkąt równoboczny $A'B'C'$ jest podobny do trójkąta ABC w skali $s = 3$. Pole trójkąta ABC jest równe $4\sqrt{3}$ cm². Oblicz długość boku trójkąta $A'B'C'$.</p>	<p>przecinająca ramiona AC i BC odpowiednio w punktach D i E, dzieli ten trójkąt na dwie figury o równych polach. W jakim stosunku (licząc od wierzchołka C) dzieli ona ramiona trójkąta?</p> <p><u>Zadanie 6.</u></p> <p>W wycinek koła o promieniu 6 cm wpisano okrąg o promieniu 2 cm. Oblicz pole wycinka koła.</p>	
--	--	--

8. Funkcja i jej własności

Tematyka zajęć:

- Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Dziedzina i zbiór wartości funkcji
- Sposoby opisywania funkcji
- Wykres funkcji
- Dziedzina funkcji liczbowej
- Zbiór wartości funkcji liczbowej
- Miejsce zerowe funkcji
- Monotoniczność funkcji
- Funkcje różnowartościowe
- Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu
- Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach
- Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności
- Zastosowanie wiadomości o funkcjach do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci wykresu funkcji


Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi odróżnić funkcję od innych przyporządkowań; – potrafi podawać przykłady funkcji; 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi określić dziedzinę funkcji liczbowej danej wzorem w przypadku, gdy wyznaczenie dziedziny funkcji wymaga rozwiązania koniunkcji 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi narysować wykresy takich funkcji, jak: $y = \text{reszta z dzielenia } x \text{ przez } 3$, gdzie $x \in \mathbf{C}$,

<p>– potrafi opisywać funkcje na różne sposoby: wzorem, tabelką, grafem, opisem słownym;</p> <p>– potrafi naszkicować wykres funkcji liczbowej określonej słownie, grafem, tabelką, wzorem;</p> <p>– potrafi odróżnić wykres funkcji od krzywej, która wykresem funkcji nie jest;</p> <p>– zna wykresy funkcji, takich jak: $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$, $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{x}$;</p> <p>– potrafi określić dziedzinę funkcji liczbowej danej wzorem (w prostych przypadkach);</p> <p>– potrafi obliczyć miejsca zerowe funkcji liczbowej (w prostych przypadkach);</p> <p>– potrafi obliczyć wartość funkcji liczbowej dla danego argumentu, a także obliczyć argument funkcji, gdy dana jest jej wartość;</p> <p>– potrafi określić zbiór wartości funkcji w prostych przypadkach (np. w przypadku, gdy dziedzina funkcji jest zbiorem skończonym);</p> <p>– potrafi na podstawie wykresu funkcji liczbowej odczytać jej własności, takie jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> dziedzina funkcji zbiór wartości funkcji miejsca zerowe funkcji argument funkcji, gdy dana jest wartość funkcji wartość funkcji dla danego argumentu przedziały, w których funkcja jest rosnąca, malejąca, stała zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne, niedodatnie, nieujemne najmniejszą oraz największą wartość funkcji; <p>– potrafi interpretować informacje na podstawie wykresów funkcji lub ich wzorów (np. dotyczące</p>	<p>warunków, dotyczących mianowników lub pierwiastków stopnia drugiego, występujących we wzorze;</p> <p>– potrafi obliczyć miejsca zerowe funkcji opisanej wzorem;</p> <p>– potrafi stosować wiadomości o funkcji do opisywania zależności w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym;</p> <p>– potrafi podać opis matematyczny prostej sytuacji w postaci wzoru funkcji;</p> <p>– potrafi naszkicować wykres funkcji kawałkami ciągłej na podstawie wzoru tej funkcji;</p> <p>– potrafi na podstawie wykresu funkcji kawałkami ciągłej omówić takie jej własności jak: dziedzina, zbiór wartości, różnowartościowość oraz monotoniczność;</p> <p>– potrafi naszkicować wykres funkcji o zadanych własnościach.</p>	<p>$y = \frac{x^2 - 6x + 9}{2x - 6}$, $y = \sqrt{4x^2 + 20x + 25}$ itp. i omówić ich własności;</p> <p>– potrafi (na podstawie definicji) udowodnić, że funkcja jest rosnąca (malejąca) w danym zbiorze;</p> <p>– potrafi (na podstawie definicji) wykazać różnowartościowość danej funkcji.</p>
--	--	--

<p>różnych zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych, socjologicznych, fizycznych);</p> <p>– potrafi przetwarzać informacje dane w postaci wzoru lub wykresu funkcji;</p> <p>– umie na podstawie wykresów funkcji f i g podać zbiór rozwiązań równania $f(x) = g(x)$ oraz nierówności typu: $f(x) < g(x)$, $f(x) \geq g(x)$.</p>		
--	--	--

Przykładowe zadania

<p><u>Zadanie 1.</u> Dana jest funkcja określona za pomocą opisu słownego: „Każdej liczbie ze zbioru $A = \{0, 1, 4, 9, 16\}$ przyporządkujemy pierwiastek kwadratowy tej liczby”. Zapisz tę funkcję za pomocą wzoru, a następnie naszkicuj jej wykres w prostokątnym układzie współrzędnych. Podaj zbiór wartości tej funkcji i jej miejsce zerowe.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Dana jest funkcja o wzorze $f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{-x}}$.</p> <p>a) Określ dziedzinę tej funkcji. b) Czy funkcja ta posiada miejsce zerowe? Odpowiedź uzasadnij. c) Oblicz wartość funkcji dla argumentu (-9).</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Poniżej podany jest dobowy wykres temperatury.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> a) Wyznacz dziedzinę funkcji danej wzorem</p> $f(x) = \sqrt{3-2x} + \frac{\sqrt{x+1}}{x^2-x}$ <p>b) Wyznacz miejsce zerowe funkcji o wzorze</p> $f(x) = \frac{ x+2 -1}{x^2-1}$ <p><u>Zadanie 2.</u> Naszkicuj wykres funkcji, której dziedziną jest przedział $\langle -6, 6 \rangle$; zbiorem wartości jest przedział $\langle 1, +\infty \rangle$; wykres funkcji jest symetryczny względem osi OY; funkcja jest rosnąca w przedziale $\langle -6, 0 \rangle$ oraz $f(0) = 4$. Czy istnieje tylko jedna taka funkcja?</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Naszkicuj wykres i omów własności funkcji określonej wzorem: $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{dla } x \leq -2 \\ x^3 & \text{dla } -1 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x} & \text{dla } x > 1 \end{cases}$.</p> <p>a) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu $3\frac{3}{8}$.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Dana jest funkcja $f(x) =$ reszta z dzielenia x przez 5, gdzie $x \in \mathbf{C}$.</p> <p>a) Narysuj wykres tej funkcji dla $x \in \{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. b) Napisz wzór opisujący miejsca zerowe tej funkcji. c) Podaj zbiór wartości funkcji.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Narysuj wykres funkcji $y = x - [x]$ dla $x \in \langle -3, 4 \rangle$ i na podstawie wykresu omów jej własności. Uwaga! Symbolem $[x]$ oznacza największą liczbę całkowitą nie większą od x.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Porównaj dziedziny i wykresy funkcji f i g, jeśli: a) $f(x) = x$ i $g(x) = \sqrt{x^2}$ b) $f(x) = x$ i $g(x) = \frac{x^2}{x}$.</p> <p><u>Zadanie 4.</u></p>
--	--	--



Odpowiedz na pytania:

- W jakich godzinach dokonywano pomiaru?
- W jakim przedziale mieszczą się zanotowane temperatury?
- W jakich godzinach temperatura wyniosła 0° ?
- W jakich godzinach temperatura była dodatnia, a w jakich ujemna?
- W jakich godzinach temperatura rostała, a w jakich malała?
- Jaką wartość miała temperatura w godzinach $\langle 12, 14 \rangle$?
- Jaką najniższą wartość wskazał termograf?

Zadanie 4.

Odległość d [km] ustalonego kolarza peletonu od mety w zależności od czasu jazdy t [h] (od chwili rozpoczęcia wyścigu do chwili przejechania mety) opisuje wzór:

$$d(t) = 180 - 45t.$$

- Ile godzin potrzeba, aby kolarz przejechał linię mety wyścigu?
- W jakiej odległości od mety będzie znajdował się kolarz po 40 minutach jazdy?
- Po jakim czasie od startu kolarz będzie znajdował się 30 km od mety?
- Jaką długość ma etap wyścigu?

b) Dla jakiego dodatniego argumentu a zachodzi równość $f(a) = -f(-a)$?

Zadanie 4.

W pewnym kraju obowiązuje system podatkowy opisany wzorem:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } 0 \leq x \leq 800 \\ 0,05x - 40 & \text{dla } 800 < x \leq 2000, \\ 0,2x - 340 & \text{dla } x > 2000 \end{cases}$$

gdzie x oznacza wysokość dochodów rocznych podatnika w dolarach, zaś $f(x)$ oznacza wysokość podatku, jaki zobowiązany jest zapłacić podatnik. Oblicz, który z podatników zapłaci większy podatek i o ile procent większy, jeśli dochód roczny pierwszego z nich wyniósł 1260 USD, zaś drugiego 3480 USD. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wyznacz dziedzinę i zbiór wartości funkcji danej wzorem:

$$f(x) = \frac{9x^2 - 12x^2 + 4}{15x - 10}$$

Zadanie 5.

Symbol $\max(a, b)$ oznacza większą z liczb a, b lub równą a , jeśli $a = b$. Naszkicuj wykres funkcji f , określonej wzorem: $f(x) = \max(x, x^2)$, gdzie $x \in \mathbf{R}$.

Zadanie 6.

Wykaż (na podstawie definicji), że funkcja opisana wzorem $f(x) = x^2$ jest rosnąca w zbiorze liczb rzeczywistych dodatnich.

<p><u>Zadanie 5.</u> Na podstawie wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż: a) równanie $x^2 = x$ b) nierówność $\frac{1}{x} > x^3$.</p>		
--	--	--

9. Przekształcenia wykresów funkcji

Tematyka zajęć:

- Podstawowe informacje o wektorze w układzie współrzędnych
- Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX
- Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY
- Przesunięcie równoległe o wektor $\vec{w} = [p, q]$.
- Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi OX
- Symetria osiowa względem osi OY
- Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu $(0, 0)$

Wymagania podstawowe	Wymagania dopełniające	Wymagania wykraczające
<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zna określenie wektora i potrafi podać jego cechy; – potrafi obliczyć współrzędne wektora, mając dane współrzędne początku i końca wektora; potrafi obliczyć współrzędne początku wektora (końca wektora), gdy dane ma współrzędne wektora oraz współrzędne końca (początku) wektora; – potrafi wyznaczyć długość wektora (odległość między punktami na płaszczyźnie kartezjańskiej); – zna określenie wektorów równych i wektorów 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zna własności działań na wektorach i potrafi je stosować w rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności; – potrafi na podstawie wykresu funkcji $y = f(x)$ sporządzić wykres funkcji: $y = f(x - a) + b$; – potrafi zapisać wzór funkcji, której wykres otrzymano w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f o dany wektor; – potrafi na podstawie wykresu funkcji f sporządzić wykresy funkcji: $y = f(x)$, $y = -f(-x)$; – potrafi zapisać wzór funkcji, której wykres 	<p>Uczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi wykorzystać działania na wektorach do dowodzenia różnych twierdzeń geometrycznych; – potrafi naszkicować wykres funkcji, którego sporządzenie wymaga kilku poznanych przekształceń; – potrafi przeprowadzić dyskusję rozwiązań równania z parametrem $f(x) = m$, w oparciu o wykres funkcji f; – potrafi rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności), dotyczące przekształceń wykresów funkcji.

<p>przeciwnych oraz potrafi stosować własności tych wektorów przy rozwiązywaniu zadań;</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrafi wykonywać działania na wektorach: dodawanie, odejmowanie oraz mnożenie przez liczbę (analitycznie); – potrafi obliczyć współrzędne środka odcinka; – zna pojęcie przesunięcia równoległego o wektor i potrafi wyznaczyć obraz figury w przesunięciu równoległym o dany wektor; – zna pojęcie symetrii osiowej względem prostej i potrafi wyznaczyć obraz figury w symetrii osiowej względem tej prostej; – zna pojęcie symetrii środkowej względem punktu i potrafi wyznaczyć obraz figury w symetrii środkowej względem dowolnego punktu; – potrafi podać współrzędne punktu, który jest obrazem danego punktu w symetrii osiowej względem osi OX oraz osi OY; – potrafi podać współrzędne punktu, który jest obrazem danego punktu w symetrii środkowej względem punktu $(0,0)$; – potrafi narysować wykres funkcji $y = f(x) + q$, $y = f(x - p)$, $y = -f(x)$, $y = f(-x)$ w przypadku, gdy dany jest wykres funkcji $y = f(x)$; – potrafi narysować wykresy funkcji określonych wzorami, np. $y = (x + 3)^2$; $y = \sqrt{x} - 4$; $y = -\frac{1}{x}$; <p>umie podać własności funkcji: $y = f(x) + q$, $y = f(x - p)$, $y = -f(x)$, $y = f(-x)$ w oparciu o dane własności funkcji $y = f(x)$.</p>	<p>otrzymano w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f względem osi OX, osi OY, początku układu współrzędnych;</p> <ul style="list-style-type: none"> – umie podać własności funkcji: $y = f(x - p) + q$, $y = -f(-x)$, $y = f(x)$ w oparciu o dane własności funkcji $y = f(x)$; – potrafi stosować własności przekształceń geometrycznych przy rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. 	
--	---	--

Przykładowe zadania


<p><u>Zadanie 1.</u> Dane są punkty: $A(2, 5)$, $B(-4, 6)$.</p> <p>a) Wyznacz współrzędne wektora \overrightarrow{AB}.</p> <p>b) Oblicz długość wektora \overrightarrow{AB}.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Dany jest wektor $\overrightarrow{AB} = [3, -6]$ oraz współrzędne punktu $B(-1, 4)$.</p> <p>a) Oblicz współrzędne punktu A.</p> <p>b) Wyznacz współrzędne środka odcinka AB.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> Narysuj dowolny trójkąt ABC, a następnie znajdź jego obraz:</p> <p>a) w symetrii środkowej względem punktu O znajdującego się wewnątrz trójkąta;</p> <p>b) w symetrii osiowej względem dowolnej prostej, która nie ma z tym trójkątem punktów wspólnych;</p> <p>c) w przesunięciu równoległym o wektor \overrightarrow{AC}.</p> <p><u>Zadanie 4.</u> W prostokątnym układzie współrzędnych narysuj odcinek AB, gdzie $A(-2, 4)$, $B(-5, -3)$, a następnie wyznacz współrzędne końców obrazu tego odcinka:</p> <p>a) w symetrii względem osi OX</p> <p>b) w symetrii względem osi OY</p> <p>c) w symetrii względem początku układu współrzędnych</p> <p>d) w przesunięciu równoległym o wektor $\vec{u} = [1, -3]$.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Dane są wektory: $\vec{a} = [1, -1]$, $\vec{b} = [2, -1]$, $\vec{c} = [-5, -7]$. Wyznacz takie liczby rzeczywiste k, l, aby $k \cdot \vec{a} + l \cdot \vec{b} = \vec{c}$.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Dany jest odcinek o końcach $A(2, -5)$, $B(-4, 7)$. Wyznacz współrzędne punktu P, który dzieli odcinek AB w taki sposób, że $\frac{ PB }{ AB } = \frac{1}{3}$.</p> <p><u>Zadanie 3.</u> O jaki wektor należy przesunąć równolegle wykres funkcji $f(x) = \sqrt{x} - 3$, aby otrzymać wykres funkcji:</p> <p>a) $g(x) = \sqrt{x} + 1$ b) $h(x) = \sqrt{x+2}$?</p> <p><u>Zadanie 4.</u> Dana jest funkcja $g(x) = 2x - 6$. Jej wykres powstał w wyniku przekształcenia wykresu funkcji $y = f(x)$ w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych. Wyznacz wzór funkcji f.</p> <p><u>Zadanie 5.</u> Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = x - 2$. Na podstawie wykresu tej funkcji rozwiąż:</p> <p>a) równania: $x - 2 = 3$; $x - 2 = x$</p> <p>b) nierówności: $x - 2 \leq 2$; $x - 2 > x^2$.</p>	<p><u>Zadanie 1.</u> Korzystając z działań na wektorach, udowodnij, że:</p> <p>a) odcinek łączący środki dwóch boków trójkąta ma długość równą połowie długości trzeciego boku tego trójkąta;</p> <p>b) długość odcinka łączącego środki ramion trapezu jest równa średniej arytmetycznej długości podstaw tego trapezu.</p> <p><u>Zadanie 2.</u> Naszkicuj wykresy funkcji:</p> <p>a) $y = -\frac{1}{x+1} - 2$ b) $y = x^3 - 1$</p> <p>c) $y = -\sqrt{-x} + 3$ d) $y = x + 5 - 3$</p> <p><u>Zadanie 3.</u> W oparciu o wykres odpowiedniej funkcji podaj liczbę rozwiązań równania, w zależności od wartości parametru m:</p> <p>a) $x - 5 - 2 = m$ b) $\left \frac{1}{x} - 2 \right = m$.</p>
---	---	---

Zadanie 7.

Dana jest funkcja $f(x) = x^3$. Naszkicuj wykres - funkcji: a) $y = x^3 + 2$; b) $y = (x + 1)^3$; c) $y = -x^3$.

Zadanie 8.

Dany jest wykres funkcji $y = f(x)$.



a) Napisz wzór funkcji g , której wykres powstanie w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f wzdłuż osi OX o 4 jednostki w prawo. Jakie miejsca zerowe ma funkcja g ?

b) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji h , której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f w symetrii względem osi OX .